

2. UČENIK UME DA OPERIŠE SA POJMOVIM DELJIVOSTI U PROBLEMSKIM SITUACIJAMA

Primer 1.

1. Odredi najmanji četvorocifren broj deljiv sa 18.

Rešenje:

Nemamo direktan kriterijum deljivosti sa 18. Razmislimo malo..... Broj 18 možemo napisati kao $18 = 2 \cdot 9$

Broj je deljiv sa 18 ako je deljiv sa 2 i sa 9.

U tekstu zadatka nije naglašeno da cifre moraju biti različite, što znači da se cifre mogu ponavljati.

Traži se najmanji četvorocifreni broj, pa ćemo sa razmišljanjem krenuti od: $100\boxed{}$.

Sad u kvadratić trebamo upisati neki od brojeva 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ali tako da taj broj bude deljiv i sa 2 i sa 9.

Znamo da je broj deljiv sa 2 ako se završava sa 0,2,4,6,8. To su moguće opcije.

Broj je deljiv sa 9 ako mu je zbir cifara deljiv sa 9.

U našem broju $100\boxed{}$ je zbir za sada $1 + 0 + 0 = 1$. Očigledno treba dodati 8 da bi bilo $1 + 0 + 0 + 8 = 9$.

Dakle, traženi broj je 1008.

Radi provere, kad podelimo $1008 : 18 = 56$.

Primer 2.

Odrediti najveći petocifreni broj kome su cifre različite a da je deljiv sa 6.

Rešenje:

Kako je $6 = 2 \cdot 3$ zaključujemo da je **broj deljiv sa 6 ako je deljiv sa 2 i sa 3.**

Kako se traži **najveći** petocifren broj a cifre da su različite, zgodno je krenuti od $9876\boxed{}$.

U kvadratić treba staviti neki od brojeva 5,4,3,2,1,0. (jer cifre moraju da se razlikuju)

Deljivost sa dva nam kaže da to mogu biti 4,2,0.

Znamo da je broj deljiv sa 3 ako mu je zbir cifara deljiv sa 3.

U našem broju $9876\boxed{}$ za sada imamo $9 + 8 + 7 + 6 = 30$ a to je deljivo sa 3, pa ćemo dodati 0.

Traženi broj je dakle: 98760.

Kad proverimo, zaista $98760 : 6 = 16460$.

Primer 3.

Odrediti najmanji trocifren broj deljiv sa 12.

Rešenje:

Kako je $12 = 3 \cdot 4$ to zaključujemo da je **broj deljiv sa 12 ako je deljiv sa 3 i sa 4.**

Kako se traži najmanji broj, krenućemo sa $10\boxed{}$, gde umesto kvadratića možemo upisati 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Broj je deljiv sa 4 ako mu je dvocifreni završetak deljiv sa 4.

Ovo nam smanjuje opcije na 0,4,8.

Da bi bio deljiv sa 3 zbir cifara mora da je deljiv sa 3. kako je $1+0+8=9$ zaključujemo da je traženi broj 108.

Zaista $108:12 = 9$

Primer 4.

Odrediti najmanji prirodan broj koji podeljen sa 6 ili 8 ili 10 daje ostatak 1.

Rešenje:

Ideja je da najpre nadjemo sadržalac za brojeve 6,8 i 10 pa da na taj broj dodamo 1.

6, 8, 10	2
3, 4, 5	2
3, 2, 5	2
3, 1, 5	3
1, 5	5
1	

$$S(6,8,10)=2*2*2*3*5=120$$

Traženi broj je $120+1 = \boxed{121}$

Primer 5.

Zbir tri uzastopna cela broja je uvek deljiv sa 3. Dokazati.

Rešenje:

Uzastopne brojeve uopšteno zapisujemo kao: $n-2$, $n-1$, n , $n+1$, $n+2$,.....

Zbir tri uzastopna broja je:

$$n + (n+1) + (n+2) = n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3 = \boxed{3 \cdot (n+1)}$$

Ovo je očigledno deljivo sa 3 jer je neki proizvod deljiv sa 3 ako je bar jedan činilac deljiv sa 3.

Primer 6.

Dokazati da je razlika kvadrata dva uzastopna neparna broja deljiva sa 8.

Rešenje:

Najpre da se podsetimo kako uopšteno obeležavamo parne i neparne brojeve.

$2n$ je paran broj

$2n+1$ ili $2n-1$ je neparan broj

Uzastopni parni brojevi bi bili : $2n-4$, $2n-2$, $2n$, $2n+2$, $2n+4$,

Uzastopni neparni brojevi bi bili : $2n-3$, $2n-1$, $2n+1$, $2n+3$,

Da postavimo sada zadatak:

Razlika kvadrata dva uzastopna neparna broja :

$$(2n+1)^2 - (2n-1)^2 =$$

Sad po formuli za kvadrat binoma imamo:

$$(2n+1)^2 - (2n-1)^2 =$$

$$(4n^2 + 4n + 1) - (4n^2 - 4n + 1) =$$

$$\cancel{4n^2} + 4n \cancel{+ 1} - \cancel{4n^2} + 4n \cancel{- 1} = \boxed{8n}$$

Napravili smo proizvod čiji je jedan činilac 8 pa je on deljiv sa 8.

Primer 7.

Ako je zbir cifara dvocifrenog broja jednocifren broj, da bi se pomnožio sa 11, dovoljno je između njegovih cifara umetnuti zbir njegovih cifara. Dokazati.

Rešenje:

Da najpre objasnimo šta ovo znači pa ćemo posle to i dokazati.

Na primer, treba da pomnožimo $32 \cdot 11$.

Šta uradimo?

Pošto je zbir cifara broja 32 manji od deset, koristimo ovo trikče:

Raširimo 3 i 2 a u sredinu stavimo $3+2 = 5$ tj. $3 \square 2 \rightarrow 352$

Koliko je recimo $54 \cdot 11$?. Koristeći trikče, raširimo 5 i 4 a između stavimo 9, $5 \square 4 \rightarrow 594$

Sad da odradimo dokaz:

Uzmimo uopšteno dvocifren broj \overline{ab} . Taj dvocifren broj možemo zapisati kao: $\overline{ab} = a \cdot 10 + b$, naravno uz uslov da je zbir cifara manji od 10, to jest $a + b < 10$

$(a \cdot 10 + b) \cdot 11 =$ sad je štos da 11 napišemo kao $11 = 10 + 1$

$$\begin{aligned} &(a \cdot 10 + b) \cdot (10 + 1) = \\ &100a + \underset{\text{Odatde izvučemo } 10}{10a + 10b} + b = \\ &100a + 10(a + b) + b \end{aligned}$$

Ovim smo dokazali traženu stvar.